



BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ LİSTESİ

DOK. NO: İY.LS.009

YAY. TRH: 08.02.2016

REV. TRH: 07.03.2022

REV NO: 01

SAYFA S 1 / 3

ACE İNHİBİTÖRLERİ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ÖNLEMLER
KAPTOPRİL RAMİPRİL ENALAPRİL FİSİNOPRİL LİSİNOPRİL, KİNAPRİL BENAZEPRİL SİLAZAPRİL PERİNDOPRİL TRANDOLAPRİL	Kapril, Kaptopril, Enalap, Enapril, Konveril, Renitec, Vasolapril, Acerilin, Rilace, Zestril, Sinopryl, Zestoretic, Sinoretic, Acuitel, Coversyl, Preterax, Delix, Monopril, Cibacen, Cibadrex, İnhibace, Tarka, Gopten	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates)	Birlikte kullanılmam alıdır.
<u>ANTİASİTLER</u>			
ALUMİNYUM İÇERENLER	Kompensan, Gaviscon, Mucaine, Talcid, Dank	Portakal suyu	Aynı anda kullanılmam alı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalı dır.
<u>ANTİBİYOTİKLER</u>			
PENİSİLİN ORAL	Cliacil, Penos, Alfoxil, Penbak, Augmentin, Duobaktam, Ampisina, Amoklavın	Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmiş soslar - ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmam alıdır.
ERİTROMİSİN	Erimicin, Eritro, Eritrosif, Eriyrocın	Asitli besinler (turunçgiller, rafine edilmiş soslar - ketçap, mayonez, hardal- gazlı içecekler) kafein, domates, meyve suları	Birlikte kullanılmam alıdır.
SİPROFLOKSASİN	Cifluran, Ciprasid, Cipro, Sispres, Ciproktan, Loxasid, Proxacin, Roflazin, Ürociproxin, Roxin, Sanset, Sifloks, Siprobel, Siprosan	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuşmeyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Aynı anda kullanılmam alı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalı dır.
TETRASİKLİNLER	Tetra, Tetralet	Kalsiyum (süt ve süt ürünleri), demir (tüm kırmızıetler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Aynı anda kullanılmam alı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
<u>ANTİDEPRESANLAR</u>			
MOKLOBEMİD	Aurorix, Lobem	Tiramince zengin besinler (krem peynir dışındaki tüm peynirler, karaciğer, salam gibi fermente sosisler, fermente soya fasulyesi ürünleri, bazı balıklar, çikolata, kahve, bazı bira ve şaraplar)	Birlikte kullanılmam alıdır.
<u>ANTİENFLAMATUVAR</u>			
SULFASALAZİN	Salazopyrin	Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek)	Birlikte kullanılmam alıdır.



BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ LİSTESİ

DOK. NO: İY.LS.009

YAY. TRH: 08.02.2016

REV. TRH: 07.03.2022

REV NO: 01

SAYFA S 2 / 3

ASETİLSALİSİLİK ASİT	Aspirin	C vitamini, Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek), Demir (tüm kırmızıyetler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Etki azalması.
<u>ANTİFUNGAL İLAÇLAR</u>			
	Triflucan	Süt, yoğurt, alkol	Etki azalması.
<u>ANTİKANSER İLAÇLAR</u>			
ETOPOSİT MERKAPTOPURİN BUSULFAN	Vepesid, Puri-nethol,	Greyfurt	Aynı anda
ESTRAMUSTİN KEPESİTABİN FLUOROUROSİL TEMOZOLAMİD HİDROKSİKARBAMİD İMATİNİB, TRETİNOİN TALİDOMİT TACROLİMUS	Myleran, Estracyt, Xeloda, UFT, Temodal, Hydrea, Glivec, Vesanoid, Thalidomide, Prograf		kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
<u>ANTİKOAGÜLANLAR</u>			
VARFAİN	Coumadin, Orfarin	K vitaminden zengin besinler (yeşil sebzeler, yonja, ıspanak, kurubaklagiller, balık) E vitamini (yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar, tahıl taneleri, kuru baklagiller) 1 litreden fazla dondurma	Tüketimi sınırlandırılmalıdır. Birlikte kullanılmamalıdır.
<u>ANTİKONVÜLZANLAR</u>			
FENİTOİN FENOBARBİTAL	Epdantoin, Epanutin	K vitaminleri (ısrırgan, balık, kabak, karnabahar, karaciğer), D vitaminleri (balıkyağı, süt, tereyağ)	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
VALPROİK ASİT	Convulex	Karnitin (kırmızı et)	Birlikte kullanılmamalıdır.
<u>BENZODİAZEPİNLER</u>			
MİDAZOLAM DİAZEPAM ALPRAZOLAM KLORDİAZEPOKSİT LORAZEPAM	Dormicum, Diazem, Lizan, Nervium, Apo-Alpraz, Xanax, Libkol, Librax, Klipaks, Ativan	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
<u>BRONKODİLATÖRLER</u>			
TEOFİLİN	Bronkolin, Talotren, Teobag, Teokap, Theodur	Çay, kahve, çikolata gibi teofilin içeren besinler	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
TERFENADİN		Greyfurt	Birlikte kullanılmamalıdır.
<u>Ca KANAL BLOKERLERİ</u>			
FELODİPİNE NİFEDİPİNE NİMODİPİNE,	Plendil, Adalat, Kardilat,	Greyfurt suyu, meyan kökü	Birlikte kullanılmamalıdır.



BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMİ LİSTESİ

DOK. NO: İY.LS.009

YAY. TRH: 08.02.2016

REV. TRH: 07.03.2022

REV NO: 01

SAYFA S 3 / 3

NİSOLDİPİNE, NİTRENDİPİN, VERAPAMİL, AMLODİPİN, DİLTİAZEM	Nidicard, Nidilat, Nimotop, Syscor, Isoptin, Veroptin, Fibrocard, Tarka, Amiodis, Amiocard, Amiovas, Diloptin, Monovas, Nipidol, Norlopin, Norvadin, Norvasc, Vasocard, Vazkor, Altizem, Dilcor, Dilticard, Diltizem, Baypres, Nitrensin		
<u>DEMİR PREPARATLARI</u>			
	Ferrosanol Duodenal, Ferrum Fort, Ferplex, Maltofer, Gyno, Ferrosanol	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
<u>DIÜRETİKLER</u>			
TRİAMTEREN, AMİLORİDE, SPİRONOLAKTON	Triamteril, Moduretic, Aldactazide, Aldactone	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates)	Birlikte kullanılmam alıdır.
<u>KARDİYAK GLİKOZİTLER</u>			
DİGİTOKSİN	Digitoksin	Meyan Kökü	Kesinlikle kullanılmam alıdır.
<u>KORTİZONLU İLAÇLAR</u>			
	Dekort, Prednol, Prednisolon, Deltacortil	Tuz, şeker, süt, yoğurt, peynir	Birlikte kullanılmam alıdır.
<u>LAKSATİFLER</u>			
BİSAKODİL	Belkunis, Bisakol, Sekolaks	Süt	Birlikte kullanılmam alıdır.
<u>STATİNLER</u>			
ATORVASTATİN SİMVASTATİN FLUVASTATİN PRAVASTATİN SERİVASTATİN	Ator, Lipitor, Lipovas, Zocor, Zovatin, Lescol, Provachol, Lipobay	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmam alıdır.
<u>TİROİD İLAÇLARI</u>			
TROİD HORMON	Levotiron, Tefor	Soya fasülyesi, şalgam, lahanası	Salgıyı inhibe eder.
<u>VİTAMİNLER</u>			
C VİTAMİNİ	Eser-vit, Redoxon, Vitabiol-C	Süt	Aynı anda kullanılmamalı, 2 saat ara verilmeli